

ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ К УЛЬТРАЗВУКОВЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ (УЗИ)

УЗИ головного мозга/сердца

Ребёнок должен быть сытым и спокойным.

УЗИ желудка

до года	от 1 года до 3 лет	от 3 до 7 лет	старше 7 лет
<ol style="list-style-type: none">1. Необходимо покормить ребёнка за 3 часа до исслед.;2. С собой необходимо принести 150 мл жидкости.	<ol style="list-style-type: none">1. Необходимо покормить ребёнка за 4 часа до исслед.;2. С собой необходимо принести 200-350 мл жидкости.	<ol style="list-style-type: none">1. Необходимо покормить ребёнка за 6 часов до исслед.;2. С собой необходимо принести 500 мл жидкости.	<ol style="list-style-type: none">1. Необходимо покормить ребёнка за 8 часов до исслед.;2. С собой необходимо принести 700 мл жидкости.

УЗИ брюшной полости/желчного пузыря

<ol style="list-style-type: none">1. Необходимо покормить ребёнка за 3 часа до начала исслед.;2. Попить разрешено за 60 минут до исслед.;3. За три дня до исслед. следует ограничить употребление продуктов, вызывающих газообразование маме (при грудном и смешанном вскармливании) и ребёнку.	<ol style="list-style-type: none">1. Необходимо покормить ребёнка за 4 часа до исслед.;2. Попить разрешено за 60 минут до исслед.;3. За три дня до исслед. следует ограничить употребление продуктов, вызывающих газообразование маме (при грудном и смешанном вскармливании) и ребёнку.	<ol style="list-style-type: none">1. Необходимо покормить ребёнка за 6 ч. до исслед.;2. Попить разрешено за 60 минут до исслед.;3. За три дня до исследования следует ограничить употребление продуктов, вызывающих газообразование.	<ol style="list-style-type: none">1. Необходимо покормить ребёнка за 8 ч. до исслед.;2. Попить разрешено за 60 минут до исслед.;3. За три дня до исслед. следует ограничить употребление продуктов, вызывающих газообразование.
---	--	--	---

УЗИ кишечника

<ol style="list-style-type: none">1. За три дня до исслед. следует ограничить употребление продуктов, вызывающих газообразование маме (при грудном и смешанном вскармливании) и ребёнку;2. Покормить ребенка за 3 часа до исслед.;3. Попить разрешено за 60 минут до исслед.	<ol style="list-style-type: none">1. За три дня до исслед. следует ограничить употребление продуктов, вызывающих газообразование маме (при грудном и смешанном вскармливании) и ребёнку;2. Покормить ребенка за 4 часа до исслед.;3. Попить разрешено за 60 минут до исслед.	<ol style="list-style-type: none">1. За три дня до исслед. следует ограничить употребление продуктов, вызывающих газообразование;2. Покормить ребенка за 6 часов до исслед.;3. Попить разрешено за 60 минут до исслед.	<ol style="list-style-type: none">1. За три дня до исслед. следует ограничить употребление продуктов, вызывающих газообразование;2. Покормить ребенка за 8 часов до исслед.;3. Попить разрешено за 60 минут до исслед.
--	--	--	--

УЗИ желчного пузыря с определением функции



0- 3	от 3 до 7 лет	старше 7 лет
<p>1. Детям до трёх лет не проводится.</p>	<p>1. Необходимо покормить ребёнка за 6 часов до исслед.;</p> <p>2. Попить разрешено за 60 минут до исслед.;</p> <p>3. За три дня до исслед. следует ограничить употребление продуктов, вызывающих газообразование;</p>	<p>1. Необходимо покормить ребёнка за 8 часов до исследования;</p> <p>2. Попить разрешено за 60 минут до исслед.;</p> <p>3. За три дня до исследования следует ограничить употребление продуктов, вызывающих газообразование;</p>
<p>4. Необходимо взять с собой желчегонный завтрак (сметану 26% жирности 100 мл, ложку или два сырых, отделенных от белка, куриных желтка).</p>		

УЗИ почек/ мочевого пузыря/ мочевого пузыря с определением остаточной мочи/ органов малого таза

до года	от 1 года до 18 лет
<p>1. Исследование проводится при полном мочевом пузыре;</p> <p>2. Желательно покормить ребёнка за 3 часа до исслед.;</p> <p>3. За 15 минут до начала исследования ребёнку необходимо дать попить с расчётом 5-10 мл на 1 кг веса и не мочиться до начала исслед.;</p> <p>4. За три дня до исследования рекомендуется ограничить употребление продуктов, вызывающих газообразование маме и ребёнку.</p>	<p>1. Желательно покормить ребёнка за 3 часа до исслед.;</p> <p>2. За час до исследования необходимо выпить необходимый объём жидкости с расчётом 5-10 мл на 1 кг веса и не мочиться до конца исслед.;</p> <p>3. За три дня до исслед. следует ограничить употребление продуктов, вызывающих газообразование.</p>

УЗДГ почек/ УЗДГ печени и селезенки

до года	от 1 года до 3 лет	от 3 до 7 лет	старше 7 лет
<p>1. Необходимо покормить ребёнка за 3 часа до начала исслед.;</p> <p>2. Попить разрешено за 60 минут до исслед.;</p>	<p>1. Необходимо покормить ребёнка за 4 часа до исслед.;</p> <p>2. Попить разрешено за 2 часа до исслед.;</p>	<p>1. Необходимо покормить ребёнка за 6 часов до исслед.;</p> <p>2. Попить разрешено за 2 часа до исслед.;</p>	<p>1. Необходимо покормить ребёнка за 8 часов до исслед.;</p> <p>2. Попить разрешено за 2 часа до исслед.;</p>
<p>3. За три дня до исследования следует ограничить употребление продуктов, вызывающих газообразование маме (при грудном и смешанном вскармливании) и ребенку.</p>		<p>3. За три дня до исслед. следует ограничить употребление продуктов, вызывающих газообразование.</p>	

г. Чебоксары, Приволжский б-р, 2, Ленинского Комсомола, 23/1
т. +7 (8352) 59-01-01, 43-01-01,  zabotik.com,  zabotik



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА